

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Juan J. Maceda, Mariano Fernández y Fabián Tittarelli

Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151 (6.300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina

Pato de collar (*Anas leucophrys*)

En la Argentina tiene una distribución que se extiende desde el norte hasta Córdoba y Buenos Aires (Olrog, 1979). En esta última provincia cuenta con registros puntuales al oeste, en zonas limítrofes a la provincia de La Pampa (Narosky y Di Giacomo, 1993), lo que permite apreciar que la especie realiza apariciones esporádicas fuera de los límites de su distribución habitual.

El 5 de noviembre de 1997 se observaron un macho y una hembra adultos mientras descansaban en la orilla de una laguna temporaria (36° 37' S: 64° 08' O), distante 10 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa, departamento Capital. Este sería la primera cita para la provincia de La Pampa.

Gaviotín lagunero (*Sterna trudeaui*)

La distribución de esta especie abarca en la Argentina, en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y por el litoral atlántico hasta el estrecho de Magallanes (Olrog, 1979; Bó *et al.*, 1995).

El 5 de octubre de 1997 se observó un ejemplar en vuelo y posteriormente posado en un banco de arena en la laguna Don Tomás. En posteriores visitas a este cuerpo de agua, durante 1997, fueron avistados grupos: el 11 de octubre, 7 ejemplares posados en la orilla de la laguna; el 18 de octubre, 4 individuos, uno de ellos se alimentaba de peces pequeños; y el 7 de noviembre, varios ejemplares sobrevolaban la laguna.

Si bien Narosky e Yzurieta (1987) y de la Peña (1992) mapean la especie para La Pampa, no contaba hasta el momento con registros concretos en esta provincia.

Rayador (*Rynchops niger*)

El 5 de julio de 1996 a las 18:15 fue observado un ejemplar adulto posado en una playa arenosa, se encontraba dentro de una bandada de gaviotas capucho café (*Larus maculipennis*) y patos pico cuchara (*Anas platalea*). Estaban en la laguna Don Tomás (36° 37' S: 64° 16' O), límite oeste de la ciudad de Santa Rosa, departamento Capital, provincia de La Pampa. Tres días después, a las 11:00, se vio nuevamente un rayador.

En las dos oportunidades el individuo observado, dada su

coloración, pertenecería a la subespecie *Rynchops niger intercedens*. Esta se distribuye por las costas de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay y en el interior de la Argentina en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires (Olrog, 1979; Narosky y Di Giacomo, 1993; Bó *et al.*, 1995; Nores, 1996). Nuestro avistaje sería el primero para la provincia de La Pampa.

Espartillero enano (*Spartonoica maluroides*)

Si bien los mapas de distribución de la especie incluyen a la provincia de La Pampa (Narosky e Yzurieta, 1987; de la Peña, 1988; Canevari *et al.*, 1991), no existen datos concretos al respecto. El espartillero enano está registrado para las provincias limítrofes: Río Negro (Sclater, 1890), Mendoza (Wetmore, 1926), San Luis (Nellar Romanella, 1993); Córdoba (Nores, 1996) y Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

El 8 de diciembre de 1997 se observaron dos ejemplares adultos posados sobre la vegetación que rodea una laguna temporaria en el cruce de las rutas nacional 5 y provincial 7 (36° 30' S: 63° 55' O), a unos 30 kilómetros al noreste de Santa Rosa, departamento Capital, provincia de La Pampa. Emitían un canto agudo y chirriado, como el descrito por de la Peña (1988). Este comportamiento, las características del lugar y la época del registro podrían indicar reproducción en la zona; Narosky *et al.* (1983) ya mencionan a La Pampa como área de nidificación de la especie.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BO, N. A., C. A. DARRIEU y A. R. CAMPERI 1995. Aves Charadriiformes: Laridae y Rynchopidae, en Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Profadu, 43 (4c).
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Guía de aves argentinas. Tomo V. L.O.L.A. Buenos Aires, 117 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1992. Guía de aves argentinas. Segunda Edición (incluye nidos y huevos). Tomo II. Ediciones LOLA, Buenos Aires, 180 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- NAROSKY, S., R. FRAGA y M. R. DE LA PEÑA. 1983. Nidificación de las aves

argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 98 páginas.

NELLAR ROMANELLA, M. M. 1993. Lista y distribución de las aves de San Luis. Museo Privado Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas "Guillermo E. Hudson". San Luis, 98 páginas.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SCLATER, P. L. 1890. Catalogue of the birds in the British Museum. London, Brit. Mus., 15.

WETMORE, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, and Chile. Bull. U. S. Nat. Mus., 133: 1-448.

Recibida: diciembre 1997

Revista Nuestras Aves 40: 19.

REGISTRO DEL BURLISTO CASTAÑO (*Casiornis rufa*) EN LA SELVA DE PUNTA LARA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Norberto H. Montaldo y G. Germán Roitman

Cátedra de Botánica Agrícola, Departamento de Ecología, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4.453 (1.417) Buenos Aires, Argentina.

El burlisto castaño (*Casiornis rufa*) habita el norte y este de Bolivia, sur y centro de Brasil y norte de la Argentina, y un pequeño número ha sido registrado durante el invierno en el sudeste de Perú (Ridgely y Tudor, 1994). En la Argentina se lo encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, este de Formosa, Chaco y Corrientes (Olrog, 1979), Santiago del Estero (Nores *et al.*, 1991) y Misiones (Chebez, 1996).

En base a una captura realizada en 1945 en el arroyo Cambado, partido de Tigre (Vasco, 1953), Narosky y Di Giacomo (1993) lo consideran como de probable presencia accidental en Buenos Aires. También en el delta bonaerense (isla Botija, partido de Zárate), el 22 de febrero de 1995, Flavio Moschione (com. pers.) observó un ejemplar de esta especie en un bosque de sauces.

El 24 de noviembre de 1997 se halló un individuo del burlisto castaño en el sector de selva ribereña de la Reserva Natural Punta Lara, partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Se encontraba en el estrato medio de la vegetación y a orillas del arroyo Las Cañas, donde fue observado durante unos diez minutos. En dicho lapso persiguió infructuosamente un insecto en vuelo y capturó dos orugas, una era de tamaño y longitud considerable, al cual golpeó varias veces contra la rama en que perchaba, antes de ingerirla con dificultad.

El presente registro es la cita más austral conocida para la especie, la primera observación para la Reserva Natural Punta Lara (ver Klimaitis y Moschione, 1987) y, junto con el dato de Moschione, confirman el estatus que Narosky y Di Giacomo (1993) adjudican a *Casiornis rufa* para Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEBEZ, J. C. 1996. Aves de la provincia de Misiones. En J. C. Chebez, Fauna Misionera: 109-179. LOLA. Buenos Aires, 318 páginas.

KLIMAITIS, J. F. y F. MOSCHIONE. 1987. Aves de la Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores. Reseña de sus relaciones con los principales ambientes y comunidades vegetales. Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 120 páginas.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ediciones y L.O.L.A. Buenos Aires, 128 páginas.

NORES, M.; D. YZURIETA y S. A. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Córdoba, 59: 157-196.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Vol. II, The Suboscine Passerines. University of Texas Press. Austin, 814 páginas.

VASCO, J. B. 1953. Hallazgo extralimitar del batará rojo. Hornero, 10: 92-93.

Recibida: diciembre 1997