



## NUEVAS LOCALIDADES PARA AVES DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Luis Volkmann y Rubén Cargnelutti

Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Delegación Córdoba. C. C. 9 (5.178), La Cumbre, Provincia de Córdoba, Argentina

En el siguiente trabajo se amplía la distribución geográfica de 18 especies en la provincia y se aportan datos de siete especies con escasos registros a nivel provincial, tomando como zona de estudio el departamento Punilla, en el noroeste de la provincia de Córdoba. El área presenta una elevada complejidad estructural, variabilidad de ambientes y de altitud, la cual se incrementa de sur a norte hasta el cerro Uritorco (1.970 m) la máxima elevación del cordón Oriental o de la Sierra Chica. Desde el punto de vista fitogeográfico, corresponde al Distrito Serrano de la provincia Chaqueña, el cual se extiende en las sierras de Córdoba, aproximadamente hasta los de latitud sur (Cabrera, 1976), con las especies vegetales típicas de esa unidad fitogeográfica, aunque en numerosos lugares empobrecida por factores antrópicos. El sector norte del departamento, a partir de la ciudad de Capilla del Monte, corresponde a un ecotono entre el distrito de Bosque serrano y el distrito de Bosque Chaqueño Oriental (Luti et al., 1979). A partir de los aproximadamente 1.500 m de altura se encuentran los pastizales de altura o pajonales, principalmente de *Stipa* y *Festuca*, que alternan, en los lugares protegidos, con diversas especies de arbustos, de los géneros *Senna*, *Berberis* y *Baccharis* (Nores, 1996), y *Heterothalamus* entre otros (Luti et al., 1979).

Las lagunas y bañados no se encuentran muy representados en el área, pero existen varios diques que albergan numerosas especies de aves acuáticas (Nores, 1996), así como también numerosos tajamares y represas de pequeñas dimensiones.

En las localidades se menciona el departamento donde se ubica solo la primera vez.

### **Pato fierro (*Oxyura dominica*)**

Nores (1996) lo cita para laguna Santo Domingo, departamento Colón, y laguna Ludueña, departamento Río Primero, se menciona que hasta 1980 era frecuente y permanente, pero que en la actualidad ha desaparecido de ambas lagunas.

Se observó en compañía de H. Casañas un ejemplar hembra en el lago San Roque, departamento Punilla, el 10 de septiembre de 1996.

### **Jote real (*Sarcoramphus papa*)**

Citado por Miatello et al. (1991) en la Quebrada de la Mermela, en las cercanías de Chancaní, departamento Pocho, quienes observaron un individuo el 6 de marzo de 1986.

Registramos un ejemplar en Los Cocos, departamento Punilla, el 1 de enero de 1995.

### **Sangual (*Pandion haliaetus*)**

Según Saggese et al. (1996), la especie cuenta con tres registros en la provincia. Nores (1996) agrega cuatro avistajes de P. Michelutti (*in litt.*) en Miramar, departamento San Justo, y en Cañada Jeanmaire, departamento San Justo, y dos de Miatello et al. (1991), en un río serrano en las cercanías de Icho Cruz y de Cuesta Blanca, departamento Punilla). Félix Vidoz (com. pers.) observó un ejemplar sobrevolando el lago Portecello, en Villa Giardino, departamento Punilla, el 7 de septiembre de 1986.

### **Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*)**

Nores (1996) lo cita para lagunas y esteros de llanura del sur y este de la provincia.

Félix Vidoz (com. pers.) observó un ejemplar adulto sobre el arroyo Los Quimbaletes, departamento Punilla, el 12 de abril de 1987.

### **Gavilán planeador (*Circus buffoni*)**

Nores (1996) lo cita para lagunas, esteros, bañados y campos circundantes de las llanuras del sur y este de la provincia, y ocasionalmente en la laguna de Pocho, departamento Pocho. Volkman y Heredia (1997) no lo citan para el departamento Punilla.

Félix Vidoz (com. pers.) observó dos ejemplares en Santa Cecilia, departamento Punilla, el 3 de marzo de 1987.

### **Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*)**

Nores (1996) cita la especie para campo abierto en la zona altoserranas sin especificar si la incluye en el sistema Uritorco como lo hace con otras especies.

Volkman y Heredia (1997) no la citan para el departamento Punilla. Se observó un ejemplar en pastizales de altura en Los Cocos, el 6 de mayo de 1998.

### **Agachona chica (*Thinocorus rumicivorus*)**

Especie considerada escasa en la provincia y citada para campo abierto en el piso superior de las sierras y campos de cultivo en la llanura de la mitad sur de la provincia (Nores, 1996), sin embargo no se especifica si se la incluye para el sistema Uritorco, Sierra Chica, como se lo hace con otras especies. Volkman y Heredia (1997) no la citan para el departamento Punilla.

Félix Vidoz (com. pers.) observó dos ejemplares en pastizales de altura, en Los Cocos, el 15 de abril de 1986. En el mismo ambiente y lugar se observó un ejemplar el 6 de junio de 1998.





### **Calancate cara roja (*Aratinga mitrata*)**

Fue citado por Frenzel (1891) y Salvadori (1891) quienes lo señalan como raro en Córdoba. Esta cita es puesta en duda por Nores (1996), lo refirieron como un error. Olrog (1959) lo señala desde Jujuy hasta Tucumán y Catamarca, también en La Rioja y oeste de Córdoba; posteriormente, Olrog (1963) señala que las procedencias de La Rioja y Córdoba necesitan ser confirmadas.

Se observó un ejemplar, posado en un aguaribay (*Schinus molle*), que consumía sus frutos en compañía de alrededor de diez ejemplares del calancate común (*Aratinga acuticaudata*), en Los Cocos, el 18 de abril de 1992. Si bien pudo tratarse de un ejemplar escapado de cautiverio, consideramos que por ser una especie típica de bosques y de selvas del noroeste argentino (Narosky e Yzurieta, 1987), en épocas pasadas, sin la degradación ambiental que presenta todo el norte cordobés, su distribución y abundancia en la zona de estudio pudo ser distinta a la actual.

### **Carpinterito común (*Picumnus cirratus*)**

La especie cuenta con pocos registros para Córdoba (Nores *et al.*, 1983; Miatello *et al.*, 1991; Giraudo *et al.*, 1993; Yzurieta, 1995).

Se observó un ejemplar en Capilla del Monte (departamento Punilla), el 14 de agosto de 1995.

### **Caminera colorada (*Geositta rufipennis*)**

Navas y Bó (1987) mencionan a la raza *ottowi* como endémica de las sierras Grandes como Chicas de Córdoba. Nores (1995) cita la especie para la Sierra Grande, y no la señala para el Pajarillo y el Uritorco (Sierra Chica). Nores (1996) pone en duda las citas de Navas y Bó (1987) por considerar que el hábitat allí es muy diferente al que la especie habita.

Se observó una bandada de más de 25 individuos en pastizales de altura con afloramientos rocosos, en las cercanías de Cruz Grande, departamento Punilla, el 17 de agosto de 1995 y el 3 de septiembre de 1995, varios individuos o en grupos aislados en pastizales de altura en Los Cocos, el 11 y 15 de septiembre de 1995, el 23 y 27 de octubre de 1995 y el 21 de noviembre de 1995 (en esta última ocasión en compañía de M. Nores).

Se confirma la presencia de esta especie para la región, tal como lo comentaran Navas y Bó (1987).

### **Bandurrita común (*Upucerthia dumetaria*)**

Nores (1995) cita la especie para la Sierra Grande, no la incluye para Pajarillo y Uritorco, Sierra Chica. Nores (1996) cita la raza *Upucerthia dumetaria hypoleuca* para terrenos rocosos y peladares del piso superior de las sierras y en invierno también más abajo, sin especificar si la incluye en el Sistema Uritorco, como lo hace con otras especies.

Se observó un ejemplar en pastizales de altura, en cercanías de Los Cocos, el 1 de junio de 1995, el 24 de agosto de 1995 y dos ejemplares el 23 de octubre de 1995; se observó un ejemplar en un bosque serrano muy empobrecido, en Los Cocos, el 14 de junio de 1995; se observó un ejemplar en ambientes de altura, en las

cercanías de Cruz Grande, departamento Punilla, el 23 de noviembre de 1995 (en compañía de M. Nores), el 27 de agosto de 1996 y el 6 de mayo de 1998.

### **Canastero pálido (*Asthenes modesta*)**

Nores (1995) lo cita para Sierra Grande y no lo incluye para Pajarillo y Uritorco, Sierra Chica. Nores (1996) lo cita para pajonales rocosos del piso superior de las sierras, sin especificar si lo incluye en el Sistema Uritorco como lo hace con otras especies.

Se observó un ejemplar en pastizales de altura con azoramientos rocosos, en cercanías de Los Cocos, el 1 de septiembre de 1995.

### **Cachudito pico negro (*Anairetes parulus*)**

Frenzel (1891) lo mencionaba como muy distribuido en todo Córdoba. Nores *et al.* (1983) y Navas y Bó (1991) lo señalan como presente de septiembre a enero en el piso superior de las sierras. Baldo y Ordano (1993), lo citan para localidades altoserranas y bajoserranas de la Sierra Grande y aportan datos invernales, se señala su presencia en forma permanente en la provincia. Nores (1996) lo cita para quebradas arbustivas húmedas y bosques de tabaquillo del piso superior de las sierras desde septiembre a enero, y pone en duda las observaciones de algunas localidades de la zona bajoserrana, que por el tipo de hábitat y época de observación corresponderían a otra especie: el cachudito pico amarillo (*Anairetes flavirostris*).

Observado en Sierra Chica en ambiente de bosque serrano, en Los Cocos, el 2 y el 3 de junio, el 16 de agosto, el 6 de septiembre, el 2 de octubre de 1995, el 9 y el 11 de noviembre de 1995 y el 28 de julio de 1996. En Huertas Malas, Capilla del Monte, el 4 de febrero de 1996 y el 8 de diciembre de 1996. En el río Cruz Grande, el 26 de abril de 1996. Esta observación coincide con lo señalado anteriormente por Baldo y Ordano (1993) se trata de una especie permanente en la provincia, presente también en ambientes bajoserranos de la Sierra Chica.

### **Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*)**

Escaso en la provincia (Nores, 1996). Nores (1996) lo cita para lagunas, esteros, bañados y campos adyacentes, a veces a bastante distancia del agua, en el este de la provincia. No citado en el departamento Punilla por Volkmann y Heredia (1997).

Félix Vidóz (com. pers.) observó dos ejemplares en un juncal en Canteras Centenario, La Cumbre, departamento Punilla, el 31 de mayo de 1987.

### **Monjita gris (*Xolmis cinerea*)**

Especie con escasos y espaciados registros en la provincia (Stempelmann y Schulz, 1890; Nores, 1996; Castellanos, 1933; Nores *et al.* (1983). Nores (1996) menciona que en la actualidad sólo ha sido observada en la parte sur y este de la laguna Mar Chiquita.

Félix Vidóz (com. pers.) observó un ejemplar en Casa Grande, departamento Punilla, el 7 de mayo de 1985 y un ejemplar en Cuchi Corral, La Cumbre, el 11 de enero de 1990.





### **Gaucho serrano (*Agriornis montana*)**

Nores (1995, 1996) lo cita para Sierra Grande y no lo incluye para Pajarillo y Uritorco, Sierra Chica.

Se Observó en pastizales de altura en las cercanías de Los Cocos el 8 de marzo, el 26 de abril, el 1 de julio, el 17 de julio, el 2 de agosto, el 3 de septiembre, el 13 de septiembre, el 31 de octubre y el 23 de noviembre de 1995 (en esta última oportunidad en compañía de M. Nores), y el 15 de junio de 1997 en el mismo ambiente.

### **Dormilona cara negra (*Muscisaxicola macloviana*)**

Nores (1996) la cita para pampas y terrenos rocosos del piso superior de las sierras y campos de llanura, sin especificar si la incluye en el Sistema Uritorco como lo hace con otras especies.

Cuatro ejemplares observados en pastizales de altura en las cercanías de Los Cocos, el 21 de mayo de 1995, y una bandada de 18 ejemplares, en el mismo lugar, el 15 de junio de 1997.

### **Dormilona gris (*Muscisaxicola rufivertex*)**

Nores (1995) la cita para Sierra Grande, y no la incluye para Pajarillo y Uritorco, Sierra Chica. Nores (1996) la cita para terrenos rocosos y pampas del piso superior de las sierras, sin especificar si la incluye en el Sistema Uritorco como lo hace con otras especies.

Se observaron dos ejemplares en pastizales de altura, en cercanías de Los Cocos, el 17 de julio de 1995.

### **Dormilona canela (*Muscisaxicola capistrata*)**

Nores (1996) la cita para pampas y terrenos rocosos del piso superior de las sierras, sin especificar si la incluye en el sistema Uritorco y el cerro Pajarillo como lo hace con otras especies.

Se observó una bandada de alrededor de 20 individuos en pastizales de altura en las cercanías de Los Cocos, el 3 de septiembre de 1995, y dos ejemplares y una bandada de 15 ejemplares en el mismo lugar el 27 de agosto de 1996.

### **Pico de plata (*Hymenops perspicillata andina*)**

Citado por Nores (1996) para terrenos rocosos y pajonales del piso superior de las sierras, pero no especifica si la incluye en el sistema Uritorco y el cerro Pajarillo.

Se observó un ejemplar macho en pastizales de altura con afloramientos rocosos y pequeños arroyos, en las cercanías de Los Cocos el 23 de octubre de 1995, se observaron tres ejemplares, dos machos y una hembra, en similar ambiente, en Macavilandia, La Cumbre, el 27 de octubre de 1995, y se observó un macho en similar ambiente, en las cercanías de Cruz Grande, el 23 de noviembre de 1995 (en compañía de M. Nores).

### **Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*)**

Escasa en la provincia (Nores, 1996). Molli (1986) la encontró nidificando cerca de Morteros, departamento San Justo. Miatello et al. (1991) la encontraron cerca de Ascochinga, departamento Colón, y a 5 km al norte de Brinkman, departamento San Justo. Nores (1996) la

Menciona en un monte cercano a la Lagunilla en Malagüeño, departamento Santa María, y en la laguna Ludueña. Se observaron dos ejemplares en un ambiente de ecotono entre bosque serrano y bosque chaqueño, en las cercanías de la localidad de Maza, departamento Punilla), el 28 de noviembre de 1995.

### **Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*)**

Nores (1996) la cita para lagunas, esteros y bañados del este de la provincia y Laguna de Pocho. Se observaron dos ejemplares adultos y un juvenil en el dique El Cajón, Capilla del Monte, el 29 de octubre de 1995.

### **Zorzalito migrador (*Catharus ustulatus*)**

Raro en la provincia, presente en quebradas boscosas húmedas de arroyos de la zona bajoserana (Nores, 1996). Se encontró en La Isla, departamento Santa María, en dos oportunidades, el 9 y 25 de febrero de 1978. Miatello et al. (1991) lo citan para la ladera oriental del cerro Pan de Azúcar, departamento Colón.

Un ejemplar se observó en el arroyo Huertas Malas, Capilla del Monte, el 1 de diciembre de 1996.

### **Monterita pecho gris (*Poospiza hypochondria*)**

Nores (1995) incluye la especie para la Sierra Grande pero no la señala para Pajarillo y Uritorco, Sierra Chica.

Baldo y Ordano (1993) y Miatello et al. (1993) realizaron numerosas citas para la Sierra Grande. Nores (1996) la menciona para terrenos rocosos y pampas arbustivas en el piso superior de las sierras, sin especificar si la incluye en el sistema Uritorco.

Se observó un ejemplar en pastizales de altura y romerillares, a unos 1.500 m sobre el nivel del mar, en las cercanías de Los Cocos, el 2 de mayo de 1996.

### **Yal plumizo (*Phrygilus unicolor*)**

Nores (1995) la cita para la Sierra Grande, pero no la incluye para el Pajarillo y el Uritorco (Sierra Chica). Nores (1996) la cita para terrenos rocosos, céspedes y peladares del piso superior de las sierras, sin especificar si la incluye en el Sistema Uritorco. Volkmann y Heredia (1997) no la citan para el departamento Punilla.

Félix Vidoz (com. pers.) observó un ejemplar en Mesa de la Mula Muerta, cercanías de río Pintos, departamento Punilla, en septiembre de 1989.

Agradecemos a Félix Vidoz, por la valiosa información que facilitó desinteresadamente. A Hernán Casañas, por la lectura crítica del trabajo y a Fernando Fulca.

### **BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- BALDO, J. N. y M. ORDANO. 1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María, Punilla, Provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 48: 1-5.
- CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. *Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería*, tomo 2 (fasc. 1). Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires, 85 páginas.
- CASTELLANOS, A. 1931-1934. *Aves del valle de los Reartes*





(Córdoba). El Hornero, 4: 361- 391; 5: 1-40, 159- 174, 307-339.

FRENZEL, J. 1891. Uebersicht uber die in der Provinz Córdoba (Argentitien) vorkommenden Vogel. J. f. Orn., 194: 113-127.

GIRAUDO, A. R., D. BRUNELLO y G. BROGGINI. 1993. Nidificación del carpinterito común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves, 28: 24-25.

LUTI, R., M. A. BELTRÁN DE SOLÍS, F. M. GALERA, N. MULLER DE FERREYRA, M. NORES, M. A. HERRERA y J. C. BARRERA. Vegetación de la provincia de Córdoba. En J. B. Vázquez, R. A. Miatello y M. E. Roque (eds.), "Geografía Física de la Provincia de Córdoba": 297-368. Ed. Bolt.

MIATELLO, R., V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba. Rep. Argentina. Hist. Nat., 9: 1-5.

MIATELLO, R., C. ROSACHER y V. COBOS. 1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Nótulas Faunísticas, 50: 1-12.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

NAVAS, J. R. y N. A. BÓ. 1987. Notas sobre Fumariidae argentinos (Aves, Passeriformes). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool., 14: 55-86.

NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cba., 56 (1-2): 1-114.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1993. Especiación en las Sierras Pampeanas de Córdoba San Luis (Argentina), con descripción

de siete nuevas subespecies de aves. El Hornero No Extraordinario: 88- 102.

NORES, M. 1986. Diez nuevas subespecies provenientes de islas ecológicas argentinas. El Hornero 12 (4): 262-273.

NORES, M. 1995. Insular biogeography of birds on mountain-tops in north western Argentina. Journal of Biogeography, 22: 61-70.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.

OLROG, C. 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Univ. Nac. de Tucumán e Inst. Miguel Lillo. Tucumán, 345 páginas.

OLROG, C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana, 9: 1-377.

PARTRIDGE, W. H. 1953. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. El Hornero, 10: 23-73.

SAGGESSE, M., S. KRAPOVICKAS, E. HAENE Y E. DE LUCCA. 1996. Presencia del águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en Argentina y Uruguay. El Hornero, 14 (3): 44-49.

SALVADORI, T. 1891. Catalogue of birds in the British Museum. 20. Taylor y Francis. London.

STEMPELMANN, H. y F. SCHULZ. 1890. Enumeración de las aves de la provincia de Córdoba (República Argentina). Bol. Acad. Nac. Cienc. Cba., 10: 393-409.

VOLKMANN, L. y J. HEREDIA. 1997. Lista de campo de las aves de Punilla. Ed. de los autores.

YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica. Ministerio de Agricultura y Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba, República Argentina, 396 páginas.

Recibida: septiembre 1998

Revista Nuestras Aves, 41: 26.

## FIOFÍO PLOMIZO (*Elaenia strepera*) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Luis Rafael Volkmann

Asociación Ornitológica del Plata, Delegación Córdoba C. C. Olrog, Casilla de correo 9, (5.178) La Cumbre, Provincia de Córdoba, Argentina

El fiofío plumizo (*Elaenia strepera*) es un ave de ambientes yungueños cuya distribución conocida abarca desde el noroeste argentino hasta el norte de Venezuela; nidifica en las laderas este de los Andes en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina (tan al sur como el noreste de La Rioja), migrando en invierno hasta el norte de Venezuela con registros en el este de Colombia y este de Perú (Ridgely y Tudor, 1989).

Se observó un ejemplar en Los Cocos, departamento Punilla, provincia de Córdoba, entre el 23 y el 27 de diciembre de 1997. El individuo emitía distintas vocalizaciones en el estrato alto del bosque serrano, ubicado a una altura aproximada de 1.300 m. Este bosque está compuesto por molles (*Lithraea ternifolia*), cocos (*Fagara coco*), talas (*Celtis tala*) y aguaribays (*Schinus molle*). La especie no estaba citada para la provincia de Córdoba

(cfr. Nores, 1996).

Por lo tanto, se incluye esta especie en el listado de la avifauna cordobesa, y quedará para futuros estudios y observaciones la delimitación y confirmación de su estatus como especie ocasional o en expansión en el territorio provincial.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.

RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1989. The birds of South America. Volume I: The oscine passerines. Univ. of Texas Press, 516 páginas.

Recibida: octubre de 1998