



COMUNICACIONES

Las comunicaciones son notas breves donde se dan a conocer registros novedosos o actualizados dentro de la distribución de la especie y en áreas naturales protegidas que ya contaban con inventarios ornitológicos realizados.



La quiula puneña (*Tinamotis pentlandii*) en los Nevados del Aconquija, Provincia de Tucumán (Argentina)

Por Lidoro Antonio Toranzo. Perú 3.513 (4.000) San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

El 10 de abril de 1994 fue observado y fotografiado un ejemplar de quiula puneña a los 4.080 m sobre el nivel del mar, en la quebrada del río Chiflón (66° 04' O, 27° 10' S) del cerro Tipillas (5.250 m de altura), integrante del sistema de Nevados del Aconquija, provincia de Catamarca, ligeramente al sur del paralelo de los 27°, a unos cinco kilómetros del límite con Tucumán.

Este registro lo realizaron Pablo Toranzo y Eneas Toranzo junto a Sergio Rodríguez y Mario Sánchez. En el

lugar hay pastos conocidos como iros (*Festuca* sp.) y no se encuentran habitantes a varios kilómetros a la redonda.

Aunque la especie ya estaba mencionada para la región (Olrog, 1949), existen pocos registros recientes para Catamarca.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: OLRÓG, C. C. 1949. Breves notas sobre la avifauna del Aconquija. *Acta Zoológica Lilloana*, 7: 139-159.



Nuevos registros de aves para Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires (Argentina)

Por Carlos Leveau y Lucas Leveau. Costa Rica s/n, (7.005) Villa Cacique, Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El partido de Benito Juárez, ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ha sido muy poco visitado por ornitólogos y observadores de aves. Se han registrado 110 especies para la zona sudeste del partido (Leveau y Leveau, 1997).

Las observaciones se realizaron en la localidad de Villa Cacique (37° 40' S; 59° 23' O) y alrededores, ubicada a 55 km de Benito Juárez, la cabecera del partido. En la zona hay arboledas (mayormente eucaliptos), áreas rurales y pastizales para pastoreo, al norte se destacan las sierras de Tandilia.

Aguilucho alas largas (*Buteo albicaudatus*): el 17 de mayo 1995 se observó un ejemplar al sudeste de Villa Cacique, en un eucaliptal. Según Narosky y Di Giacomo (1993) la especie es rara y no posee cita alguna para el partido de Benito Juárez.

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): el 15 de diciembre de 1995, se avistó un individuo en un canal al lado de la ruta provincial N° 80, en los alrededores de Villa Cacique. La especie es un visitante estival (Narosky y Yzurieta, 1987).

Cuenta con pocos registros para la zona, por ejemplo una observación para la región de Bahía Blanca (Belenguer et al., 1993).

Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*): el 24 de agosto de 1997 se observó una bandada de doce ejemplares, en Villa Cacique. La especie pareciera recuperarse en la provincia lentamente según varios observadores en Narosky y Di Giacomo (1993).

Lechuzón orejudo (*Asio clamator*): el 8 de enero de 1998 se observó un ejemplar en una arboleda ubicada al sudeste de Villa Cacique. Considerado raro para la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993), cuenta con registros recientes para los partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita, donde parece extender su distribución natural al utilizar las arboledas implantadas (Martínez et al., 1996).

Nuestra observación es una de las más australes en la Argentina para esta especie.

Fiofio silbón (*Elaenia albiceps*): el 28 de diciembre de 1997 se registró un individuo, en una plantación de eucaliptos, al sudeste de Villa Cacique. La especie fue identificada gracias a su canto, un fio-fio-fio, descrito por Narosky y Yzurieta (1987) y De la Peña (1988), que emitía constantemente y se lograba escuchar desde varios metros de distancia. Este tiránido tiene pocos registros para la provincia, con observaciones para el sur (Belenguer et al., 1993; Narosky y Di Giacomo, 1993; Delher y Carrete, 1999). Varios investigadores (ver Narosky y Di Giacomo, 1993) indican que el fiofio silbón realiza ocasionales migraciones post-reproductivas hacia este sector de la provincia.

Mosqueta estriada (*Myiophobus fasciatus*): el 5 de diciembre de 1997, se observó un ejemplar en la zona sudoeste de la Estancia San José, que linda al oeste con Villa Cacique. Se lo vio en busca de materiales para construir su nido. Tiene pocas citas para el sudeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Golondrina zapadora (*Riparia riparia*): del 29 de diciembre de 1995 al 29 de enero de 1996 se observaron dos ejemplares al sur de Villa Cacique. Narosky y Di Giacomo (1993) lo mencionan como un raro visitante estival para localidades al este de la provincia. En la región de Bahía Blanca es escaso (Belenguer et al., 1993).

Cachirla chica (*Anthus lutescens*): el 5 de marzo de 1998 se avistó un individuo en un pequeño pastizal en el oeste de Villa Cacique. Esta especie posee muy pocas citas para el sudeste bonaerense, en la provincia es escasa y probable residente (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Naranjero (*Thraupis bonariensis*): el 25 de julio de 1995 se observó un macho junto a varias hembras en parques de Villa Cacique. Según Narosky y Di Giacomo (1993) habita el este y sudeste de la provincia, donde es escaso y más