



rados o de colores dan mucha información sobre migraciones, costumbres, período de vida, causas de muerte de aves silvestres y criadas en cautiverio.

El éxito del programa de anillado depende en gran me-

didada de que el público avise del hallazgo de anillos.

Cada anillo devuelto añade nuevos detalles de información y hasta puede significar un descubrimiento novedoso.



Albinismo de un ejemplar de remolinera andina (*Cinclodes oustaleti*)

Por Jorge Veiga, Riglos 1.295, (1.424) Buenos Aires, Argentina

En los alrededores de Copahue, departamento Ñorquín, provincia del Neuquén, Argentina, observé el 23 de enero de 1998 un subadulto de la remolinera andina con plumaje albino; las patas y el pico tenían una tonalidad amarilla.

Se desplazaba a salititos con movimientos lentos y pausados, entre rocas y se metía en las grietas dejadas por la nieve. Era alimentado por uno de sus padres (ver fotografía).

En ningún momento fue atacado o molestado por la remolinera común (*Cinclodes fuscus*) y el yal plumizo (*Phrygilus unicolor*), de los cuales había varios ejemplares en el lugar. Cabe recordar que Herrera (1993) comenta que en una bandada mixta un individuo albino de saíra dorada (*Hemithraupis guira*) era continuamente acosado por otras aves.

No hay ejemplares albinos de la remolinera andina depositados en los museos de La Plata (cfr. Zapata y Novatti, 1979) ni en el "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires (J. Navas, com. pers.).

Agradezco la información brindada por el doctor Jorge Navas y las sugerencias de Marcos Babarskas.



J. Veiga

BIBLIOGRAFÍA CITADA: HERRERA, G. A. 1993. Albinismo en un ejemplar de saíra dorada (*Hemithraupis guira*). *Nuestras Aves*, 28: 29. ZAPATA, A. y R. NOVATTI. 1979. Aves albinas en la colección del Museo de La Plata. I, No Passeriformes. *El Hornero*, 12 (1): 1-10.



Nuevas citas de aves para el partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina

Por Ignacio Roesler, Beruti y Brown s/n, (6.230) General Villegas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: roesler@infovia.com.ar

Observaciones de 18 especies con escasa información para el partido de General Villegas (63° O: 35° S), en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Martineta copetona (*Eudromia elegans*). En el pasado fue común, inclusive en grandes bandadas. Ahora es observada ocasionalmente en campos con pastizales naturales, en grupos de dos o tres ejemplares. Considerada en peligro en la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Garcita azulada (*Butorides striatus*). Se observó un ejemplar adulto con plumaje nupcial, el 28 de diciembre de 1997, en arbustos del pastizal salobre, al costado de una laguna, y el 4 de enero de 1998, en juncales. Especie común de las zonas ribereñas de Buenos Aires, con dos registros para el oeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*). Observado en diversas ocasiones en vuelo sobre campos o sobre la ciudad.

El 7 de abril de 1995 fue registrado un grupo de cuatro ejemplares, entre ellos dos jóvenes, volando sobre la ciudad.

Este jote no tiene registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Playerito unicolor (*Calidris bairdii*). Una bandada de unos diez individuos, el 10 de marzo de 1997, en una laguna junto a un grupo de playerito de rabadilla blanca (*Calidris*

fuscicollis).

El playerito unicolor es un escaso visitante estival con pocos registros para el interior de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).


Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*). El 8 de junio de 1998 en un campo arado se encontraban varias bandadas, que por momentos se juntaban; se trataría de unos cien individuos. Es un común visitante de la provincia, pero sin registros recientes para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agachona chica (*Thinocorus rumicivorus*). El 8 de junio de 1998 junto con la especie anterior fue visto un grupo de esta especie de aproximadamente 20 individuos. Es considerada una escasa visitante invernal del centro sur y este de la provincia, en disminución (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cuculillo canela (*Coccyzus melacoryphus*). El 28 de noviembre de 1997, en un pinar, se observó dos ejemplares.

Otro ejemplar en el pueblo el 20 de enero de 2001. Es un ave común en el nordeste y en el sur pero sin registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Ñacundá (*Podager nacunda*). Se lo ve frecuentemente sobrevolando campos o zonas urbanizadas durante los



atardeceres de verano, nunca después de fines de febrero.

El 5 de enero de 1997 fue observada una pareja con un juvenil volando bastante bajo sobre la ciudad. Es un escaso habitante estival del este de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Bandurrita chaqueña (*Upucerthia certhioides*). El 4 de mayo y el 3 de agosto de 1997 fue visto un ejemplar en una construcción abandonada; recorría una pila de leña seca.

En Buenos Aires es considerada rara y tiene pocos registros para la zona del caldenal y para el este de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cachudito pico amarillo (*Anairetes flavirostris*). El 24 de julio de 1995 se observó un individuo de esta especie en la ciudad. Es una especie que cuenta con muy pocos registros para toda la provincia y con uno antiguo para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*). Se lo observa frecuentemente en lugares alejados de zonas húmedas como en girasolares, cardales y pastizales con predominancia de quinoa; también frecuente pastizales que se encuentran en bordes de lagunas. En lagunas se lo puede llegar a ver junto al doradito común (*Pseudocolopteryx flaviventris*). El doradito copetón es raro en la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993), sin embargo aquí es relativamente común en diversos ambientes y durante todo el año.

Chiví común (*Vireo olivaceus*). Se observó un individuo el 27 de diciembre de 1996 y varios días posteriores, en un área con frutales de la estancia Don Pedro. El 20 de enero de 1997 en área parqueada con olmos se observaron tres individuos y se escuchaban por lo menos dos más. Es un escaso habitante de la zona nordeste de la provincia y con una cita antigua para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*). El 23 de mayo de 1998 en una arboleda exótica se registró un ejemplar. La especie no cuenta con registros para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*). Se lo observa escasamente en primavera y verano en parques y patios dentro de la ciudad, pero es más común en aquellos lugares arbolados y con ligustro (*Ligustrum lucidum*) o paraíso (*Melia azedarach*). Es un escaso habitante de toda la provincia y sin registros para el noroeste bonaerense (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Golondrina barranquera (*Notiochelidon cyanoleuca*). El 26 de octubre de 1997 se avistó en un lote con avena un individuo solitario. También una bandada en el Parque Municipal el 11 de agosto de 1999. Común en Buenos Aires,

pero sin menciones para el noroeste provincial (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). El 2 de enero de 1998 una bandada de aproximadamente 20 individuos junto a un grupo de golondrina de rabadilla canela (*Hirundo pyrrhonota*) sobrevolando un campo sembrado con maíz. Considerada ocasional y con pocos registros para el nordeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cachirla chica (*Anthus lutescens*). Es una de las cachirlas más comunes de la zona, se la puede encontrar generalmente en campos con pastos cortos, ya sean húmedos o no, en particular en praderas inundadas. Escaso en la provincia, con pocas menciones para el oeste (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cachirla chaqueña (*Anthus chacoensis*). Es la más conspicua de las cachirlas de la zona, ya que su canto puede escucharse desde muy lejos y es uno de los más llamativos.

Relativamente común en campos con sembradíos de avena, soja y alfalfa, pero siempre en lugares donde la altura del cultivo es mayor a los veinte centímetros. Los machos cantan no muy distanciados unos de otros, es bastante común ver dos o tres en un mismo lote. En la zona se la escucha cantar desde mediados de octubre hasta principios de marzo donde ya lo hace muy poco (Casañas, Roesler y Klavins, en preparación). Esta cachirla cuenta con muy pocos registros para la provincia. Estos son los primeros para el noroeste bonaerense (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Chogüí (*Thraupis sayaca*). Un individuo se observó el 23 de mayo de 1998 junto a un grupo de naranjeros que se alimentaba en unos frutales en la ciudad. En la provincia está mencionado para la región nordeste (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Naranjero (*Thraupis bonariensis*). Actualmente es muy rara y solamente se la encuentra en patios o parques con árboles frutales, como granada. Según los pobladores de la zona, hace cincuenta años era frecuente y hasta en grupos de cinco o seis individuos. En la zona contaba con una cita antigua (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agradezco la colaboración de Juan Mazar Barnett en la crítica del manuscrito y a Diego Monteleone por la ayuda en alguna salidas al campo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.