



rados o de colores dan mucha información sobre migraciones, costumbres, período de vida, causas de muerte de aves silvestres y criadas en cautiverio.

El éxito del programa de anillado depende en gran me-

didada de que el público avise del hallazgo de anillos.

Cada anillo devuelto añade nuevos detalles de información y hasta puede significar un descubrimiento novedoso.



Albinismo de un ejemplar de remolinera andina (*Cinclodes oustaleti*)

Por Jorge Veiga, Riglos 1.295, (1.424) Buenos Aires, Argentina

En los alrededores de Copahue, departamento Ñorquín, provincia del Neuquén, Argentina, observé el 23 de enero de 1998 un subadulto de la remolinera andina con plumaje albino; las patas y el pico tenían una tonalidad amarilla.

Se desplazaba a salititos con movimientos lentos y pausados, entre rocas y se metía en las grietas dejadas por la nieve. Era alimentado por uno de sus padres (ver fotografía).

En ningún momento fue atacado o molestado por la remolinera común (*Cinclodes fuscus*) y el yal plumizo (*Phrygilus unicolor*), de los cuales había varios ejemplares en el lugar. Cabe recordar que Herrera (1993) comenta que en una bandada mixta un individuo albino de saíra dorada (*Hemithraupis guira*) era continuamente acosado por otras aves.

No hay ejemplares albinos de la remolinera andina depositados en los museos de La Plata (cfr. Zapata y Novatti, 1979) ni en el "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires (J. Navas, com. pers.).

Agradezco la información brindada por el doctor Jorge Navas y las sugerencias de Marcos Babarskas.



J. Veiga

BIBLIOGRAFÍA CITADA: HERRERA, G. A. 1993. Albinismo en un ejemplar de saíra dorada (*Hemithraupis guira*). *Nuestras Aves*, 28: 29. ZAPATA, A. y R. NOVATTI. 1979. Aves albinas en la colección del Museo de La Plata. I, No Passeriformes. *El Hornero*, 12 (1): 1-10.



Nuevas citas de aves para el partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina

Por Ignacio Roesler, Beruti y Brown s/n, (6.230) General Villegas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: roesler@infovia.com.ar

Observaciones de 18 especies con escasa información para el partido de General Villegas (63° O: 35° S), en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Martineta copetona (*Eudromia elegans*). En el pasado fue común, inclusive en grandes bandadas. Ahora es observada ocasionalmente en campos con pastizales naturales, en grupos de dos o tres ejemplares. Considerada en peligro en la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Garcita azulada (*Butorides striatus*). Se observó un ejemplar adulto con plumaje nupcial, el 28 de diciembre de 1997, en arbustos del pastizal salobre, al costado de una laguna, y el 4 de enero de 1998, en juncales. Especie común de las zonas ribereñas de Buenos Aires, con dos registros para el oeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*). Observado en diversas ocasiones en vuelo sobre campos o sobre la ciudad.

El 7 de abril de 1995 fue registrado un grupo de cuatro ejemplares, entre ellos dos jóvenes, volando sobre la ciudad.

Este jote no tiene registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Playerito unicolor (*Calidris bairdii*). Una bandada de unos diez individuos, el 10 de marzo de 1997, en una laguna junto a un grupo de playerito de rabadilla blanca (*Calidris*

fuscicollis).

El playerito unicolor es un escaso visitante estival con pocos registros para el interior de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*). El 8 de junio de 1998 en un campo arado se encontraban varias bandadas, que por momentos se juntaban; se trataría de unos cien individuos. Es un común visitante de la provincia, pero sin registros recientes para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agachona chica (*Thinocorus rumicivorus*). El 8 de junio de 1998 junto con la especie anterior fue visto un grupo de esta especie de aproximadamente 20 individuos. Es considerada una escasa visitante invernal del centro sur y este de la provincia, en disminución (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cuculillo canela (*Coccyzus melacoryphus*). El 28 de noviembre de 1997, en un pinar, se observó dos ejemplares.

Otro ejemplar en el pueblo el 20 de enero de 2001. Es un ave común en el nordeste y en el sur pero sin registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Ñacundá (*Podager nacunda*). Se lo ve frecuentemente sobrevolando campos o zonas urbanizadas durante los