

- DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor. Santa Fe, 229 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1989. Guía de aves argentinas. Tomo VI. L.O.L.A. Buenos Aires, 125 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Nidos y huevos de aves argentinas. Fundación Hábitat. Santa Fe, 369 páginas.
- HÖY, G. 1976. Notas nidobiológicas del noroeste argentino. *Physis*, C 35 (90): 205-209.
- MARTÍNEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, 1: 1-61.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59 (3-4): 157-196.
- NORES, M., D. YZURIETA, S. SALVADOR y L. SALVADOR. 1996. Nuevos registros de aves para Formosa. *Nuestras Aves*, 33: 31-32.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

Recibida: abril de 1999

Revista Nuestras Aves, 42: 18-20

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA EL CENTRO DE LA ARGENTINA

Alejandro G. Di Giacomo¹, Adrián S. Di Giacomo² y Carlos A. Marchisio^{2 y 3}

¹ Reserva Ecológica El Bagual, San Francisco de Laishi (3.601) Formosa, Argentina

² Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, 25 de Mayo 749, 2º piso 6, (1.002) Buenos Aires, Argentina

³ Guardafauna de San Francisco, Dirección de Recursos Naturales, provincia de Córdoba, Argentina

Durante los últimos años hemos recopilado registros novedosos para la distribución de algunas aves en prospecciones realizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. La aparición reciente de trabajos sobre la distribución de las especies en varias de estas provincias (Nellar Ramonella, 1993; Nores, 1996; De la Peña, 1997) permite actualizar información sobre 20 especies e incorporar nuevas formas en algunos casos o nuevas localidades en otros. Los registros de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba pertenecen a Carlos Marchisio, residente en el lugar. Se incluye también información proveniente de una piel depositada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Bandurria mora (*Harpiprion caerulescens*)

El 13 de noviembre de 1994 un ejemplar fue observado en las cercanías de la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Especie incluida como dudosa por Nores (1996), sobre la base de la mención de accidental que, para la provincia, hiciera Olrog (1959). Por otra parte fue observada en Las Palmeras, departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe (De la Peña 1997), unos 100 km al nordeste de nuestro hallazgo cordobés.

Sirirí colorado (*Dendrocygna bicolor*)

El 19 de noviembre de 1992 se observaron cuatro ejemplares, junto con el sirirí pampa, en una laguna temporaria en Jacinto Arauz, departamento Hucal, provincia de La Pampa.

La distribución conocida llega hasta Córdoba, Santa Fe y centro de Buenos Aires (Olrog 1979, Narosky y Di Giacomo 1993). Yzurieta (1995) al comentar la distribución fuera de

Córdoba, incluye sin detalles el nordeste de La Pampa.

Sirirí pampa (*Dendrocygna viduata*)

El 19 de noviembre de 1992 se registró una bandada de unos 30 ejemplares, junto con el sirirí colorado, en una laguna temporaria en Jacinto Arauz, departamento Hucal, provincia de La Pampa. Recientemente Serracín y Romero (1998) lo citan para el norte de la provincia, aunque Yzurieta (1995) incluyó el nordeste de La Pampa, al comentar la distribución fuera de Córdoba.

Ipacaá (*Aramides ypecaha*)

Un ejemplar fue observado en el área rural de Saturnino M. Laspur, departamento San Justo, provincia de Córdoba. La especie solo tiene dos registros para la desembocadura del río Segundo (Nores *et al.*, 1983; Yzurieta, 1995; Nores, 1996).

Burrito grande (*Porzana albicollis*)

El 2 de septiembre de 1997, un ejemplar fue hallado muerto en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba. El día anterior hubo en la zona un fuerte temporal de lluvia y granizo.

Es tratado como dudoso por Nores (1996), quien considera como probablemente errónea la inclusión de Córdoba en la distribución de la especie que hiciera Olrog (1979).

Playero zancudo (*Calidris himantopus*)

El 6 de febrero de 1993 en Tortugas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, se hallaron cuatro individuos en un campo encharcado, junto con otros chorlos (*Tringa flavipes*, *Calidris melanotos*, *Bartramia longicauda*, *Gallinago paraguaiae*, *Himantopus mexicanus*).

Especie con pocos registros para Santa Fe, y citada para el norte y centro provincial (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña 1988 y 1997).

Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*)

El 20 de noviembre de 1992 se observaron 10 ó 12 ejemplares en una laguna temporaria, en Jacinto Arauz, departamento Hucal, provincia de La Pampa.

Aravena (1970) la menciona para La Pampa y Narosky *et al.* (1990) la citan para el límite interprovincial con Buenos Aires, algo más al norte que este registro.

Gaviotín pico grueso (*Sterna nilotica*)

El 7 de febrero de 1993, se hallaron cinco ejemplares en la laguna de Melincué, departamento General López, provincia de Santa Fe.

Citado solo para el centro de la provincia (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997).

Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*)

Un macho fue observado el 6 de febrero de 1993, en Cruz Alta, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

La especie es considerada un visitante invernal en la provincia y solo posee tres localidades conocidas: bañados del río Dulce, Monte de las Barrancas y Villa María (Nores e Yzurieta, 1981; Yzurieta, 1995; Nores, 1996).

Vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*)

Una bandada de 20 ejemplares fue observada el 3 de diciembre de 1994, en la quebrada del arroyo El Molino, cerca de Merlo, departamento Junín, provincia de San Luis.

La especie era conocida en la provincia, solo para dos localidades: La Florida y San Luis Capital (De Lucca, 1989; Nellar Ramonella, 1993).

Picaflor de barbijo (*Heliomaster furcifer*)

Desde el 26 de noviembre al 5 diciembre de 1994 fue registrado diariamente y fotografiado en el área urbana de Merlo, departamento Junín, provincia de San Luis. Todos los ejemplares vistos eran machos. Se observaron hasta tres individuos próximos entre sí.

Según Nellar Ramonella (1993) es una especie alguna vez citada u observada en la provincia y que requiere confirmación.

Espartillero enano (*Spartonoica maluroides*)

El 6 de febrero de 1993 fue observado un ejemplar en un campo natural encharcado, en cercanías de Tortugas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.

Según Martínez Achenbach (1957) y De la Peña (1997) es una especie rara con registros dispersos en el centro provincial.

Choca común (*Thamnophilus caerulescens*)

El 30 de noviembre de 1994 fue observado un macho en un parche de monte natural en proximidades de Merlo, departamento Junín, provincia de San Luis.

La especie solo era conocida en la provincia por dos registros para la Quebrada de las Higueritas (Nellar Ramonella, 1993).

Piojito gris (*Serpophaga nigricans*)

Un ejemplar fue registrado el 5 de febrero de 1993 en Alcorta, departamento Constitución, provincia de Santa Fe.

Según De la Peña (1997) se trata de una especie escasa y distribuida por el este, sobre el río Paraná, hasta el centro de la provincia.

Picabuey (*Machetornis risoxa*)

El 10 de octubre de 1993 fue observado un ejemplar en el camino de acceso a la laguna del Viborón, departamento Maipú, provincia de Mendoza.

Chebez *et al.* (1993) citan la especie para el sur mendocino y para Neuquén; Haene *et al.* (1995) dan un registro para la ciudad de Mendoza, y Olrog y Pescetti (1991) la señalan para el ángulo nordeste del territorio mendocino.

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*)

La especie fue registrada en dos oportunidades en las proximidades del arroyo El Molino, Merlo, departamento Junín, provincia de San Luis, el 29 de noviembre de 1994 (tres ejemplares) y el 4 de diciembre de 1994 (dos individuos).

Especie no citada para la provincia (Nellar Ramonella, 1993). Para una recopilación de su distribución en el país ver Salvador y Salvador (1990) y Haene y Ostrosky (1993).

Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*)

En el Museo Argentina de Ciencias Naturales existe un ejemplar macho (Nº 44.958) colectado por William Partridge, el 21 de enero de 1961, en Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

La especie solo era conocida para tres localidades de la zona bajoserrana (Nores e Yzurieta, 1981; Nores *et al.*, 1983; Miatello *et al.*, 1991; Yzurieta, 1995; Straneck, 1999; Volkmann y Cargnelutti, 2001).

Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)

El 10 de octubre de 1993 un ejemplar fue visto en el Parque San Martín y otro en las afueras de la ciudad Mendoza, sobre la ruta provincial 20, departamento Capital, provincia de Mendoza.

La distribución conocida de la especie llega hasta La Rioja, nordeste de San Luis, Córdoba, Santa Fe, norte y este de Buenos Aires (Olrog, 1979; Olrog y Pescetti, 1991; Narosky y Di Giacomo, 1993; Nellar Ramonella, 1993) y La Pampa (Babarskas y Haene, en Chebez *et al.*, 1998), sin incluir Mendoza.

Cachirla chica (*Anthus lutescens*)

Varios ejemplares fueron observados el 5 de febrero de 1993 en Bigand, departamento Caseros y en Montes de Oca y Tortugas, departamento Belgrano, en el sur de la provincia de Santa Fe.

Según De la Peña (1997) es una especie común, registrada en el centro y norte provincial.

Cachilo corona castaña (*Aimophila strigiceps*)

Entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre de 1994 la especie fue registrada casi diariamente en parches de monte natural y arbustos, en las cercanías de Merlo, departamento Junín, provincia de San Luis.

Especie no citada para la provincia (ver Navas, 1965 y Nellar Ramonella, 1993).

Agradecemos a Horacio Aguilar, Viviana Aguilar, Bibiana Insúa, Santiago Krapovickas, Tito Narosky y Diego Zelaya que nos acompañaron en algunas de las campañas. Al doctor Jorge Navas, por permitirnos consultar la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y a Aves Argentinas y Humedales Internacional por financiar parcialmente algunos de los viajes realizados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ARAVENA, R. O. 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Serie folletos, 13, 31 páginas.
- CHEBEZ, J. C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993. Novedades ornitológicas argentinas IV. Nótulas Faunísticas, 38: 1-11.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA 12. Buenos Aires, 126 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. Nuestras Aves, 16: 17-18.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía LOLA 15. Buenos Aires, 128 páginas.
- DE LUCCA, E. 1989. Vencejo de collar en San Luis. Nuestras Aves, 19: 9.
- HAENE, E. y C. OSTROSKY. 1993. El suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) en San Juan. Nuestras Aves, 28: 29.
- HAENE, E. H., S. F. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. El Hornero, 14: 48-52.
- MARTÍNEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", 1: 1-61.
- MIATELLO, R., V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Historia Natural, 8: 1-5.
- NAVAS, J. R. 1965. Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. El Hornero, 10: 215-224.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A., Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, S., A. G. DI GIACOMO y B. LÓPEZ LANÚS. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. El Hornero, 13: 173-178.
- NELLAR ROMANELLA, M. M. 1993. Lista y distribución de las aves de San Luis. Museo Privado Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas "Guillermo E. Hudson". San Luis, 98 páginas.
- NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Historia Natural, 2: 33-42.
- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 56 (1-2): 1-114.
- OLROG, C. C. 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Univ. Nac. de Tucumán e Inst. Miguel Lillo. Tucumán, 345 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
- OLROG, C. C. y E. A. PESCETTI. 1991. Las aves del Gran Cuyo. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de Campo. Cricyt. Mendoza, 160 páginas.
- SALVADOR, S. A. y L. A. SALVADOR. 1990. Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors*, *Lophornis chalybeay* *Tyrannus tyrannus*. El Hornero, 13: 178-179.
- SERRACÍN, R. A. y F. ROMERO. 1998. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa. Nuestras Aves, 38: 9-10.
- STRANECK, R. J. 1999. Nuevas localidades para aves de la Argentina. Revista Museo Ciencias Naturales (Nueva serie), 1 (2): 173-180.
- VOLKMAN, L. y R. CARGNELUTTI. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves, 41: 23-26.
- YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica. Ministerio de Agricultura y Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba, República Argentina, 396 páginas.

Recibida: abril de 1999