



Albinismo en carancho (*Caracara plancus*) y gaviota cocinera (*Larus dominicanus*)

Por Pablo F. Petracci¹, J. Kaspar V. Delhey² y Cristian H. F. Pérez^{3,1} Patricios 712, (8.000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. ² Quillén 75, (8.000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. ³ Los Copihues s/n, (8.364) Chimpay, Río Negro, Argentina

Carancho (*Caracara plancus*)

El 10 de enero de 1998, dentro de la Reserva Provincial Cabo Dos Bahías, en el camino hacia el mirador de la isla Arce (45° S; 65° 30' O), provincia de Chubut, se observó y fotografió un ejemplar que presentaba albinismo incompleto (según Zapata y Novatti, 1979) en compañía de un individuo de pigmentación normal. Al intentar aproximarlos volaron y se posaron junto a otro ejemplar que tenía albinismo imperfecto.

En la colección ornitológica del Museo de La Plata se encuentran depositados tres ejemplares con albinismo imperfecto, provenientes de la zona de Cabo Dos Bahías (Zapata y Novatti, 1980).

Otros hallazgos de caranchos albinos en la Argentina corresponden a del Blanco (1987) para Dolores, provincia de Buenos Aires, que menciona constantes ataques por parte de individuos normales y De la Peña (1988) que registra un carancho albino junto a uno de pigmentación normal en Coronda, provincia de Santa Fe, pero sin mencionar actitudes agresivas entre ellos.

En nuestro caso no se observaron indicios de ataques entre los tres caranchos observados. A los registros anteriores se le debe sumar la observación de Castellanos (Anónimo, 1933) como se lee en la sección "Movimiento Social" de la revista El Hornero: "El doctor Alberto Castellanos presenta la foto de un carancho blanco y un grupo de pingüinos, de su último viaje al Chubut", viaje que fue realizado en 1932 (Anónimo, 1932). Resulta llamativa la alta incidencia relativa de albinismo en la zona costera de la provincia de Chubut.

Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*)

El 22 de mayo de 1998 se observó un ejemplar de esta especie con albinismo incompleto en compañía de un individuo de la misma especie en la localidad de Monte Hermoso (38° 59' S; 61° 17' O), partido homónimo, provincia de Buenos Aires.

Presentaban el pico pardo-amarillento, las patas rosadas y el plumaje casi completamente blanco, con algunas plumas pardas en el lomo. Las dos gaviotas se encontraban descansando a la orilla del mar, luego levantaron vuelo para unirse a una bandada de 200 gaviotas de la misma especie. El individuo albino exhibía un comportamiento nervioso efectuando constantes movimientos ascendentes y descendentes de la cabeza mientras abría y cerraba el pico. No se observaron en ningún momento actitudes agresivas hacia el individuo albino. En la bibliografía revisada no se hallaron registros de albinismo en esta especie, aunque no son infrecuentes entre las gaviotas (Burger y Gochfeld, 1996).

BIBLIOGRAFÍA CITADA: ANÓNIMO. 1932. Movimiento Social. El Hornero, 5 (1): 97-104. ANÓNIMO. 1933. Movimiento Social. El Hornero, 5 (2): 231-254. BURGER, J. y M. GOCHFELD. 1996. Family Laridae (Gulls). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.), "Handbook of the Birds of the World, vol. 3, Hoatzin to Auks": 572-623. Lynx Ediciones. Barcelona. DE LA PEÑA, M. 1988. Albinismo en aves de Santa Fe. Nuestras Aves, 16: 16. DEL BLANCO, H. S. 1987. Un carancho albino. Nuestras Aves, 13: 19-20. ZAPATA, A. R. P. y R. NOVATTI. 1979. Aves albinas en la colección del Museo de La Plata. El Hornero, 12 (1): 1-10.



Primer registro de diadema (*Catamblyrhynchus diadema*) para el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina

Por Mercedes Rouges y Dana Seaman. Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, C. C. 34, (4.107) Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Correos electrónicos: liey@tucbbs.com.ar y piaya@arnet.com.ar

La diadema (*Catamblyrhynchus diadema*) es una especie rara y muy local en bosques montanos húmedos de los Andes (Ridgely y Tudor, 1989; Hilty y Brown, 1986), desde Venezuela hasta el noroeste de la Argentina, entre los 1.800 m y los 3.500 m (Stotz et al., 1996).

El primer registro de diadema para la Argentina corresponde a Contino quien en 1957 colectó un ejemplar macho adulto en Santa Bárbara, Jujuy (Höy et al., 1963). A partir de entonces los registros de esta especie han sido escasos.

En Jujuy, en el Parque Nacional Calilegua (23° 35' S; 64° 54' O) se realizaron cuatro registros visuales recientes en el área de Mesada de las Colmenas ubicado a 1.150 m (julio

1993, agosto 1995, agosto 1996, en Di Giacomo et al. 1997; octubre 1997, Cerutti com. pers.). Un quinto registro en agosto de 1995 en Sevinguillar a 1.400 m y un sexto en junio de 1996 sin detalles de la ubicación (Di Giacomo et al., 1997).

Para la provincia de Salta, existen hasta el momento dos registros de diadema: un ejemplar colectado a 1.000 m de elevación en el Parque Nacional Baritú (22° 27' S; 64° 24' O) en agosto de 1993 (Di Giacomo et al., 1997) y un ejemplar observado por Mosqueira (com. pers.) en 1996 en la sierra de Santa Bárbara a aproximadamente 1.500 m de altura.

El 28 de agosto de 1998 capturamos un ejemplar de diadema en el Parque Nacional El Rey (26° 25' S; 65° 26' O)